

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОЙ (ПЕРВИЧНОЙ), БУСТЕРНОЙ И ПОВТОРНОЙ (СЕЗОННОЙ) ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19

КОНТИНГЕНТ	ОСНОВНАЯ (первичная) вакцинация	БУСТЕРНАЯ вакцинация	ПОВТОРНАЯ (сезонная) вакцинация
<p>лица 18-25 лет (студенты, курсанты и учащиеся очной формы обучения учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, лица, переболевшие инфекцией COVID-19 и другие)</p>	<p>СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или иное ИЛС</p>	<p>через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации с использованием СПУТНИК ЛАЙТ</p>	<p>через 12 месяцев после бустерной вакцинации с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иное ИЛС</p>
<p>лица 18 лет и старше, в том числе с ослабленным иммунитетом, лица старше 60 лет, лица, принимающие иммуносупрессивную терапию, находящиеся на гемодиализе, медицинские работники, работники стационарных учреждений социального обслуживания, лица, переболевшие COVID-19</p>	<p>Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или SINOPHARM, или СПУТНИК ЛАЙТ, или иное ИЛС</p>	<p>через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации с использованием СПУТНИК ЛАЙТ</p>	<p>через 12 месяцев после бустерной вакцинации с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иное ИЛС</p>
			<p>через 12 месяцев после бустерной вакцинации с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иное ИЛС</p>
<p>лица 12-17 лет в случае наличия информированного согласия родителей (законных представителей) на проведение вакцинации, не ранее 6 месяцев после перенесенной ребенком инфекции COVID-19</p>	<p>SINOPHARM</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>лица 18 лет и старше, после перенесенного COVID-19</p>	<p>ОСНОВНАЯ (первичная) вакцинация: через 2-8 недель (в зависимости от формы заболевания) после выздоровления с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или SINOPHARM, или СПУТНИК ЛАЙТ, или иное ИЛС: через 2 недели - после COVID-19 в легкой форме; через 4 недели - после COVID-19 в среднетяжелой форме; через 6 недель - после COVID-19 в тяжелой форме; через 8 недель - после COVID-19 с осложнениями.</p>		

Автор: Тищенко Е.Н. Редактор: Бувина С.А.